

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	MOMENTO DE APLICACIÓN
Trigo - Cebada - Centeno	0,5 a 0,65 lt/ha	Iniciar la pulverización al momento del macollaje y suspender a principios de encañado y durante la espigazón.
Avena - Alpiste	0,35a 0,5 lt/ha	Durante macollaje: No pulverizar cultivos ya encañados o durante la espigazón.
Maíz - Sorgo	0,35 lt/ha	En los primeros estados vegetativos, cuando el sembrado cuenta con 10-20 cm de altura y las malezas son jóvenes. Empleando la "barra de trigo"
	0,5 a 0,65 lt/ha	En cultivos más desarrollados, empleando barra provista de prolongadores para pulverizar la maleza por debajo de las hojas del cultivo. No pulverizar durante la época de floración.
Mijo	0,35 a 0,6 lt/ha	Pulverizar desde el comienzo del macollaje, suspendiendo cuando se inicie el encañado.
Papa	0,35 a 0,5lt/ha	Cuando el papal tiene 10-15 cm de altura. No hacerlo durante la floración. Admite una combinación de 2,4 D AMINA ICONA 70 SL de 250 cm ³ y Matayuyo selectivo MCPA 500 cm ³
Campo Natural, especialmente cardos y abrepunños	0,7 a 1,55 lt/ha	Pulverizar las malezas a principio de su estado vegetativo (rosetas). Durante la época invernal el resultado será más lento que en primavera.
Praderas artificiales de gramíneas (verdeos)	0,5 a 0,65 lt/ha	Cuando despues de pastoreados el "verdeo" se destine a cosecha, no pulverizar el sembrado al estado de plántula y durante la encañazon y espigazón, hacerlo exclusivamente durante el macollaje.
Caña de azúcar	1 a 1,75 lt/ha	En post-emergencia, pulverizar cuando las plantas superen los 20 cm de altura.
Arroz	0,65 a 1,50 lt/ha	Pulverizar desde que el cultivo empieza a macollar y hasta antes del encañado. Es preferible realizar el tratamiento con poca o sin agua de riego
Tratamiento pre-cosecha	1 a 1,50 lt/ha	En cereales finos, arroz, maíz, sorgos, y linos, para facilitar la cosecha mecánica practicarlo una vez que el grano haya pasado el estado lechoso y siempre que la maleza no esté próxima a completar su desarrollo.
Camino, alambrados, y vías ferreas	1,5 a 2,5 lt/ha	Pulverizar cuando las malezas se desarrollan vigorosamente (pequeñas). En caso de requerirse un segundo tratamiento se aplicará el herbicida sobre rebrotes en plena actividad vegetativa (antes de la floración).