

RECOMENDACIONES DE USO:

Generalidades: Este producto está recomendado para el control de plagas que atacan a los granos. La combinación de D.D.V.P. (órgano fosforado) con la deltametrina (piretroide) permite aumentar su espectro de acción. Actúa por inhalación, contacto e ingestión.

Plagas que controla: Taladrillo o escarabajo de los granos (*Rhizopertha dominica*), Gorgojos (*Sitophilus granarius*, *sitophilus oryzae*, *sitophilus sea mais*), Palomita de los cereales (*Sitotroga cerealelia*), Polilla india de la harina (*Plodia interpunctella*), Carcoma achatado (*Laemophloeus spp.*), Carcoma dentada (*Oryzaephilus surinamensis*), Gorgojo de la harina (*Tribolium confusum*, *Tribolium castaneum*), Arañuela de la harina (*Acarus siro*).

INSTRUCCIONES PARA EL USO:

Preparación: Verter la cantidad necesaria del producto en el tanque del equipo pulverizador, una vez que haya sido llenado con agua hasta 2/3 partes de su capacidad; agitar y completar el llenado. La preparación debe hacerse inmediatamente antes de su aplicación. NO GUARDE EMULSIONES DE UN DIA PARA OTRO.

RECOMENDACIONES DE USO:

Plagas de los granos almacenados.

Tratamientos preventivos: Usar de 10 a 20 cc. de DEVETION PLUS en 0,5 a 1 litro de agua por tonelada de grano. Aplicar sobre el grano en movimiento ubicando el dosificador sobre el sinfín del elevador, lo más próximo posible a la entrada del silo para evitar pérdidas del producto. En óptimas condiciones de temperatura y humedad. Se debe conocer la capacidad de trabajo de la noria, sinfín o chimango y el caudal de la máquina pulverizadora que podrá ser una máquina específica o que se adapte a este uso. El tratamiento directo de los granos no afecta el poder germinativo, y pasados los lapsos consignados en restricciones de uso, puede ser liberado al consumo sin ningún compromiso.

Tratamiento de depósitos, sitios, molinos o bodegas vacías: Antes de introducir el grano es necesario limpiar prolijamente el interior de los locales. Luego aplicar una emulsión preparada con 1 litro de producto cada 100 litros de agua. Utilizar aproximadamente 1 litro de emulsión cada 100 metros cúbicos de capacidad del local. Cerrar lo más herméticamente posible y comenzar la aplicación por el extremo más alejado de la salida, retrocediendo hacia ésta. Dejar transcurrir como mínimo 5 horas antes de abrir el local. Ventilar bien antes de llenar.

Tratamiento en exteriores: La parte externa de los lugares de almacenamiento de grano deberá ser tratada cada 10 a 15 días con una emulsión que contenga 2 litros de formulado cada 100 litros de agua, pulverizando a razón de 5 litros cada 100 metros cuadrados. Tratar de mantener bien limpios los lugares cercanos.

Tratamiento del equipo antes de la cosecha y limpieza de camiones, acoplados o vagones utilizados para su transporte: Limpiar prolijamente restos de cosechas anteriores. Pulverizar con una emulsión preparada con 2 litros de formulado cada 100 litros de agua las máquinas cosechadoras, utilizando pulverizadores manuales o a motor, tratando de llegar a cualquier lugar que pueda servir de refugio para los insectos. Tratar de la misma forma los vagones y acoplados.

Tratamiento bolsas vacías y/o cereales embolsados: Extender las bolsas en el suelo, una a continuación de otra y pulverizarlas utilizando una emulsión al 1% (1 litro de

producto en 100 litros de agua) humedeciendo las bolsas sin llegar a mojarlas, Armar los líos teniendo la precaución de que la cara no tratada esté contra la tratada de otro.